

使用指導のポイント

前頁①②の質問から使用可能な方には、次のことを必ず守ってナシビン[®]Mスプレーを使用するように指導してください。

- ・定められた用法・用量を厳守してください。
- ・本剤は作用時間が長く、1日1~2回の使用で効果を示します。
過度に使用しますと、かえって鼻づまりを起すことがあります。
- ・点鼻用にのみ使用してください。

〈使用にあたっての注意〉

- (1) 容器を横にして使用しますと、薬液が霧状になりませんので、必ず垂直にしてお使いください。
- (2) ご使用前には鼻をかみ、鼻腔の通りをよくしておいてください。
- (3) ご使用後はノズルをティッシュペーパーなどで拭いて、清潔に保ってください。
- (4) 容器の先が鼻汁等に触れると、薬液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。

副作用と思われる次の症状が現れた場合は医師または薬剤師に相談してください。

●本剤の使用により、あらわれることが予測される副作用症状です。このような症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤化を未然に防ぐため、本剤の使用を中止させ、医師への相談を勧めるなど適切なアドバイスをお願いします。

部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感、乾燥感、鼻水、くしゃみ
精神神経系	神経過敏、頭痛、めまい、不眠症
循環器	動悸
消化器	悪心・嘔吐

●3日間位使用しても症状がよくなる場合

3日間位使用しても症状の改善がみられない場合は、他に原因があることも考えられますので、本剤の使用を中止させ、医師への相談を勧めるなど適切なアドバイスをお願いします。

■成分・分量：100mL中 オキシメタゾリン塩酸塩・・・0.05g

添加物としてホウ酸、ホウ砂、ベンザルコニウム塩化物を含有します。

■効能：急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による鼻づまり

■用法・用量：右記の1回量を各鼻腔に噴霧してください。

なお、適用間隔は、10~12時間以上おいてください。

連続して1週間を超えて使用しないでください。*

使用を中止した場合は2週間以上あけてください。

症状が改善したら使用を中止してください。

年齢	1回使用量	1日使用回数
成人 (15歳以上)	各鼻腔に 2~3度ずつ	1~2回
15歳未満	使用しないでください	

※過度に連用した場合には、鼻粘膜の反応性が低下して効果が現れにくくなったり、鼻粘膜に慢性的なうっ血症状(反応性充血)を引き起こす場合があります。

鼻炎用持続性点鼻薬

オキシメタゾリン塩酸塩配合

ナシビン[®]Mスプレー

適正使用のチェックシート

次のことを確認し、適切に指導してください。

①薬剤師は、次の質問で一つでも「はい」と答えた方には本剤を使用させないでください。

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- Q1：本剤に対してアレルギー症状を起こしたことがありますか。 はい いいえ
- Q2：モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)を服用していますか。 はい いいえ
- Q3：15歳未満ですか。 はい いいえ
- Q4：本剤を連続して1週間を超えて使用していますか。
(本剤の連用により鼻粘膜障害が発現するおそれがあります) はい いいえ
- Q5：本剤を粘膜、創傷面又は炎症部位に長期連用または大量使用していますか。 はい いいえ

上記にすべて「いいえ」と答えた方

②薬剤師は、次の質問で一つでも「はい」と答えた方には本剤の使用を注意し、場合によっては医師に相談するように指導してください。

- Q1：医師の治療を受けていますか。 はい いいえ
- Q2：妊婦又は妊娠していると思われるか。 はい いいえ
- Q3：本人又は家族がアレルギー体質ですか。 はい いいえ
- Q4：薬によりアレルギー症状を起したことがありますか。 はい いいえ
- Q5：次の診断を受けたことがありますか。
●高血圧 ●心臓病 ●糖尿病 ●甲状腺機能障害 ●緑内障 はい いいえ

上記にすべて「いいえ」と答えた方

ナシビン[®]Mスプレー

を使用できます。

